

CARACTERÍSTICAS EN LA PRODUCCIÓN DEL HABLA EN NIÑOS DE 6 A 7 AÑOS CON FRENILLO LINGUAL ALTERADO

AUTORES: Nora Y. Fajardo P. , Mónica M. Harm F.D. Mónica. P. Paredes G
INSTITUCIÓN: Centro Peruano De Audición, Lenguaje y Aprendizaje
PAIS: Lima-Perú

RESUMEN

Objetivo: Determinar las características en la producción del habla, en niños con frenillo lingual alterado. **Método:** Fueron evaluados 109 niños de 6 a 7 años a quienes se aplicó el examen clínico contenido en el Protocolo de Evaluación del Frenillo de la Lengua de Irene Marchesan (2009). Se realizaron mediciones del frenillo lingual, se observó la posición y la movilidad de la lengua y la apertura bucal durante la producción del habla. **Resultados:** Los resultados encontrados evidencian que un 12% de la población (13 niños) presentó frenillo lingual alterado, de los cuales 4 (30%) muestran alteraciones en la forma de la lengua durante su elevación. Durante el habla se observa que 12 niños (92%) presentan afectación de la movilidad lingual, 10 (77%) muestran apertura bucal reducida y 9 (69%) presentan un posición inadecuada de la lengua (baja o anteriorizada). Presentaron alteraciones del habla 10 niños (77%), siendo las más frecuentes las distorsiones (76.92%), seguida por las sustituciones (46.15%) y las omisiones (38.46%). Los fones que presentan alteraciones en su producción son el vibrante múltiple /r/, el vibrante simple /r/ y sus grupos consonantales. **Conclusión:** Se encontró una prevalencia de 77% de alteraciones en la producción de habla en los sujetos con frenillo lingual alterado.

Palabras clave: Frenillo Lingual Alterado, Habla, Producción del Habla

